

Capitolo 2

Disfunzioni sessuali maschili


..e pur si muove!





**Stimoli visivi,
acustici, olfattivi,
tattili, uditivi**


T Testosterone

**Stimoli cognitivi,
immaginari,
mnemonici**











Fase flaccida

Fase rigida



Desiderio

Piacere




Erezione

in alcuni
comparsa
liquido
trasparente

Eiaculazione

Detumescenza




- 
- A spiral-bound notebook with a light beige cover and a silver metal spiral binding on the left side. The notebook is open to a blank page with a light beige background. A list of four items is written in black text on the page.
- Disfunzioni dell'erezione
 - Disfunzioni dell'eiaculazione
 - Dolore
 - Preoccupazioni su falsi problemi

Disfunzioni dell'erezione

- Disfunzione di prevalente origine psicologica
- Disfunzione da prevalente danno delle strutture organiche
- Disfunzione di origine mista

Adrenalina



Chiusura dei piccoli vasi arteriosi, aumento battiti cardiaci, sudorazione....



Poiché l'erezione del pene avviene per vasodilatazione, è ovvio che in presenza di vasocostrizione.....

Disfunzioni dell'eiaculazione

- Eiaculazione precoce:
- **primitiva**: presente fin dalle prime esperienze sessuali, in ogni occasione
- **secondaria**: presente in soggetto che in un precedente periodo descrive un accettabile-buon livello del controllo eiaculatorio e, per motivi a lui sconosciuti, ne manifesta l'insorgenza

Eiaculazione precoce

IELT: tempo di latenza eiaculatoria intravaginale è il lasso di tempo che intercorre tra l'intromissione in vagina e l'eiaculazione



<1 min				> 4 min		6 min	

Eiaculazione precoce

- Alla base vi sono fattori psicologici e/o fattori organici.
- Il trattamento si può avvalere dell'uso di alcuni farmaci o di terapie comportamentali mansionali.

Dolore

- Talvolta, in occasione di erezioni molto prolungate, e magari non concluse con l'eiaculazione, è possibile avvertire dolore ai testicoli o al pene.
- Eccezionalmente è anche possibile avere degli spasmi dolorosi all'inizio o alla fine dell'eiaculazione.



Preoccupazioni su falsi problemi

- **Dimensioni del pene**
- Il micropene e' un evento raro (anomalia congenita) e viene diagnosticato alla nascita.
- La dimensione del pene non e' importante né si misura in condizioni di flaccidità, ma in erezione.
- La vagina, in condizioni di eccitazione "bagnata", si adatta a qualsiasi pene che non sia troppo lungo.
- Il piacere proprio e della partner e' correlato alla complicità di coppia che si ottiene con dolcezza, e non alla lunghezza del pene

Preoccupazioni su falsi problemi

- La fuoriuscita, in alcune condizioni di forte stimolo sessuale, di un liquido trasparente, non rappresenta una eiaculazione
- Si tratta di un liquido prodotto da ghiandole situate nell'uretra, che ha lo scopo di lubrificare il glande, preparandolo alla penetrazione.

